

**Հակաբեղմնավորման և հղիության մասին գրքույկ
Վալպրոաթթու պարունակող դեղեր օգտագործող աղջիկների, երիտասարդ կանանց
և վերարտադրողական տարիքի կանանց համար**

Կարդացեք այս գրքույկը դեղի փաթեթում տեղադրված ներդիր-թերթիկի հետ միասին՝ վալպրոաթթվի մասին ամբողջական տեղեկատվություն ստանալու համար։ Հակաբեղմնավորում և հղիություն ։ ինչ պետք է իմանաք։

Այս գրքույկը Ձեզ համար է, եթե Դուք աղջիկ եք, երիտասարդ կամ վերարտադրողական պոտենցիալ ունեցող կին եք, ով օգտագործում է վալպրոաթթու պարունակող դեղ։

Այս գրքույկը պարունակում է հիմնական տեղեկատվություն հղիության ընթացքում վալպրոաթթվի օգտագործման ոիսկերի վերաբերյալ։

Եթե ունեք հարցեր, դիմեք Ձեր բժշկին։

Պահպանեք այս գրքույկը։ Հնարավոր է, որ Ձեզ անհրաժեշտ լինի նորից կարդալ այն։

Բովանդակություն

1. Հիմնական տեղեկություններ, որոնք պետք է հիշել
2. Ի՞նչ վտանգներ է սպառնում Ձեր երեխային հղիության ընթացքում վալպրոաթթու օգտագործելիս。
 - Բնածին արատներ
 - Մտավոր և ֆիզիկական զարգացման խնդիրներ
3. Հակաբեղմնավորում (հղիության կանխարգելում)
4. Ես 18 տարեկան եմ կամ ավելի բարձր. ի՞նչ է ինձ համար նշանակում վալպրոաթթու ընդունել:
 - Սկսում եմ բուժումը վալպրոաթթվով
 - Ես ընդունում եմ վալպրոաթթու պարունակող դեղ և չեմ պլանավորում երեխա ունենալ
 - Ես ընդունում եմ վալպրոաթթու պարունակող դեղ և պատրաստվում եմ երեխա ունենալ
 - Ես ընդունում եմ վալպրոաթթու պարունակող դեղ և հղի եմ կամ կասկածում եմ, որ հղի եմ
5. Ես մինչև 18 տարեկան եմ. ի՞նչ է ինձ համար նշանակում վալպրոաթթու ընդունել։

1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ՀԻՇԵԼ

- Վալյորոաթթու պարունակող դեղերն օգտագործվում են էպիլեպսիայի և երկրսեռ խանգարումների բուժման համար:
- Վերարտադրողական տարիքի կանայք և աղջիկները վալյորոաթթու պետք է ընդունեն միայն այն դեպքում, երբ այլ դեղերն արդյունավետ չեն, քանի որ հիդրովառական ընթացքում վալյորոաթթվի ընդունումը կարող է լուրջ վնաս հասցնել արգանդում զարգացող երեխային:
- Եթե Դուք վալյորոաթթու եք ընդունում և կարող եք հիջանալ.
- Միշտ օգտագործեք արդյունավետ հակաբեղմնավորում:
- Երբեք մի դադարեցրեք հակաբեղմնավորիչների ընդունումը:
- Եթե հիջություն եք պլանավորում.
- Մի դադարեցրեք հակաբեղմնավորիչների ընդունումը Ձեր բժշկի հետ խորհրդակցելուց առաջ:
- Երբեք մի դադարեցրեք վալյորոաթթվի ընդունումը առանց բժշկի խորհրդատվության, քանի որ դա կարող է վատթարացնել Ձեր վիճակը:
- Եթե Դուք հիջացել եք վալյորոաթթու օգտագործելու շրջանում Ձեզ մոտ սկսվել է հիջություն.
- Մի դադարեցրեք վալյորոաթթվի օգտագործումը, քանի որ դա կարող է վատթարացնել Ձեր էպիլեպսիան կամ երկրսեռ խանգարումը:
- Որքան հնարավոր է շուտ խորհրդակցեք բժշկի հետ՝ քննարկելու Ձեր հետագա բուժման տարրերակները և այն ամենը, ինչ Դուք պետք է իմանաք: Ձեր բժիշկը կբացատրի, թե արդյոք Դուք պետք է անցնեք այլ բուժման և ինչ պետք է անել դրա համար:
- Հիշեք՝ պարբերաբար այցելել Ձեր բժշկին (առնվազն տարին մեկ անգամ):
- Առաջին ընդունման ժամանակ, և դրանից հետո ամեն տարի, Դուք և Ձեր բժիշկը կքննարկեք, կլրացնեք և կստորագրեք ոիսկի մասին տեղեկացված լինելուհամաձայնության ձևաթուղթը՝ որպեսզի համոզվեք, որ լավ տեղյակ եք հիջության ընթացքում վալյորոաթթվի օգտագործման ոիսկերին և հասկանում եք հիջությունը կանխելու անհրաժեշտությունը՝ բուժման ընթացքում:

2. Ի՞ՆՉ ՈՒՍԿԵՐ ԿԱՆ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՎԱԼՅՈՐՈԱԹԹՈՒ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԴԵՂԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻՄ

Որքան մեծ է վալյորոաթթվի դեղաչափը, այնքան մեծ է վտանգը երեխայի համար, սակայն վալյորոաթթվի ցանկացած դեղաչափն ընդունելը ոիսկեր է պարունակում:

Հղիության ընթացքում վալյուութեավի ընդունումը կարող է առաջացնել լուրջ բնածին արատներ:

- Հղիության ընթացքում վալյուութեավու պարունակող դեղն ընդունելիս 100 երեխայից մոտավորապես 11-ի մոտ կարող է զարգանալ բնածին արատ, մինչդեռ ընդհանուր բնակչության կանանց շրջանում բնածին արատներ են հայտնաբերվում 100 երեխայից 2-3-ի մոտ:

Ի՞նչ վնաս կարող է հասցվել Ձեր երեխային:

Վալյուութեավու օգտագործելու ժամանակ հայտնաբերված բնածին արատները ներառում են, օրինակ՝

- սպինա բիֆիդա,
- դեմքի և գանգի դեֆորմացիաներ, օրինակ՝ «նապաստակի շրթունք»,
- վերջույթների, սրտի, երիկամների, միզուլիների, սեռական օրգանների, տեսողության օրգանների ոչ ճիշտ ձևավորում, որը կարող է հանգեցնել տեսողության խանգարման,
- լսողության խնդիրներ կամ խովություն:

Հղիության ընթացքում վալյուութեավի օգտագործումը կարող է ազդել Ձեր երեխայի զարգացման վրա:

Հղիության ընթացքում վալյուութեավու ընդունած կանանց երեխաների 100-ից մոտավորապես 30-40-ը կարող են ունենալ զարգացման խնդիրներ, ինչպիսիք են.

- քայլելու և խոսքի զարգացման ավելի ուշ սկիզբ,
- ցածր մտավոր ունակություններ,
- խոսքի և լեզվի յուրացման թույլ հմտություններ,
- հիշողության հետ կապված խնդիրներ:

Այս երեխաների մոտ ավելի հավանական է առտիզմ կամ առտիզմի սպեկտրի խանգարում: Բացի այդ, նրանց մոտ մեծանում է ուշադրության դեֆիցիտի և/կամ գերակտիվության զարգացման ռիսկը:

3. Հակաբեղմնավորիչ միջոցառումներ (Հղիության կանխարգելում)

Օգտագործեք արդյունավետ հակաբեղմնավորիչներ, ինչպես խորհուրդ է տալիս Ձեր բժիշկը, մինչ Դուք ընդունում եք վալյուտաթթու:

Սա անհրաժեշտ է վալյուտաթթու պարունակող դեղերի օգտագործման ժամանակ չպահանջման հղիությունից պաշտպանվելու համար, որը կարող է վնասել Ձեր երեխային:

Քննարկեք Ձեր բժշկի և/կամ գինեկուլոգի հետ Ձեզ համար հակաբեղմնավորման լավագույն միջոցը:

Դուք պետք է օգտագործեք հակաբեղմնավորման հուսալի մեթոդներ, նույնիսկ եթե սեռական ակտիվություն չունեք, եթե չկան համոզիչ ապացույցներ, որ հղիության վտանգ չկա: Ձեր բժիշկը դա կըննարկի Ձեզ հետ:

4. **Ես 18 տարեկան եմ կամ ավելի բարձր. ի՞նչ է ինձ համար նշանակում վալյուութեաւ ընդունել:**

Ակսում եմ բուժումը վալյուութեաւին

Ձեր բժիշկը կրացատրի Ձեզ, թե ինչու է նա կարծում, որ վալյուութեաւն Ձեզ համար համապատասխան բուժում է և կպատմի Ձեզ հայտնի ոխուերի մասին: Ձեր բժիշկը պետք է նշանակի վալյուութեաւի դեղեր միայն այն դեպքում, եթե որևէ այլ բուժում չի օգնում:

• Ձեր բժիշկը Ձեզ վալյուութեաւ կնշանակի միայն այն դեպքում, եթե Դուք հիշ չեք և պարբերաբար օգտագործում եք հակաբեղմնավորիչ միջոցներ:

• Ձեր բժիշկը Ձեզ կիսնդրի հղիության թեստ հանձնել:

• Ապագայում Ձեր բժշկի հետ բուժման վերանայումը պետք է իրականացվի կանոնավոր հիմունքներով, բայց առնվազն տարին մեկ անգամ:

Ձեր առաջին այցելության ժամանակ Դուք և Ձեր բուժաշխատողը կկարդաք կլրացնեք և կստորագրեք ոխուի մասին տեղեկացված համաձայնության ձևը: Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի Դուք սովորեք, հասկանար և գիտակցեք հղիության ընթացքում վալյուութեաւ պարունակող դեղեր ընդունելու հետ կապված հնարավոր ոխուերի մասին բոլոր տեղեկությունները ինչպես նաև ստանար առաջարկությունները վալյուութեաւին դեղեր ընդունելիս հնարավոր հղիության կանխարգելման վերաբերյալ: Զնը պետք է վերստորագրվի տարեկան կտրվածքով:

Ես ընդունում եմ վալյուութեաւ դեղը և չեմ պլանավորում հղիանալ

Միշտ օգտագործեք հակաբեղմնավորման հուսալի մեթոդներ, նույնիսկ եթե սեռական ակտիվություն չունեք.

• Վալյուութեաւ ընդունելու ընթացքում օգտագործեք արդյունավետ հակաբեղմնավորիչներ:

• Երբեք ինքնուրույն մի դադարեցրեք օգտագործել հակաբեղմնավորիչ միջոցները:

Եթե հակաբեղմնավորման վերաբերյալ խորհրդատվության կարիք ունեք, բնարկեք այս հարցը Ձեր բժշկի և/կամ գինեկոլոգի հետ:

Եթե հիշ եք կամ կասկածում եք, որ հիշ եք, հնարավորինս շուտ խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ: Նոյնիսկ եթե Դուք հղիանում եք, մի դադարեցրեք վալյուութեաւի ընդունումը, մինչև չխոսեք Ձեր բժշկի հետ:

Դուք պետք է պարբերաբար (առնվազն տարին մեկ անգամ) վերանայեք Ձեր բուժումը Ձեր բժշկի հետ: Ձեր տարեկան այցելության ժամանակ Դուք և Ձեր առողջապահական ծառայություններ մատուցողը կկարդար, կլրացնեք և կստորագրեք ոիսկի մասին տեղեկացված համաձայնության ձևը: Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի Դուք սովորեք, հասկանար և գիտակցեք հիփության ընթացրում վալյուութթու պարունակող դեղեր ընդունելու հետ կապված հնարավոր ոիսկերի մասին բոլոր տեղեկությունները, ինչպես նաև ստանար առաջարկություններ վալյուութթվային դեղեր ընդունելիս հնարավոր հիփության կանխարգելման վերաբերյալ:

Ես ընդունում եմ վալյուութթու դեղը և պլանավորում եմ հիփություն

Մի դադարեք վալյուութթվի կամ հակաբեղմնավորիչների ընդունումը, մինչև չքննարկեք դա Ձեր բժշկի հետ:

- Ձեր բժիշկը կարող է որոշել փոխել փոխել Ձեր վալյուութթվով բուժումը հիփությունից շատ առաջ՝ համոզվելու համար, որ Ձեր վիճակը կայուն է մնում նոր բուժման ժամանակ:
- Նախքան հիփանալ պլանավորելը, Դուք պետք է Ձեր բժշկի հետ որոշեք, թե ինչպես շարունակել Ձեր բուժումը:
- Դուք պետք է պարբերաբար վերանայեք Ձեր բուժումը (առնվազն տարին մեկ անգամ) Ձեր բժշկի հետ:

Ձեր այցելության ժամանակ Դուք և Ձեր բժիշկը կկարդար, կլրացնեք և կստորագրեք ոիսկի մասին տեղեկացված համաձայնության ձևը: Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի Դուք իմանար, հասկանար և գիտակցեք հիփության ընթացրում վալյուութթու դեղներ ընդունելու հետ կապված հնարավոր ոիսկերի մասին ամրող տեղեկատվությունը. ինչպես նաև ստանար առաջարկություններ վալյուութթվի դեղեր ընդունելիս հնարավոր հիփության կանխարգելման վերաբերյալ:

Ես ընդունում եմ վալյուութթու դեղը և հիփ եմ կամ կասկածում եմ, որ հիփ եմ

Մի դադարեցրեք վալյուութթվի ընդունումը, այլապես Ձեր էպիլեպսիան կամ երկրսեռ խանգարումը կարող է վատթարանալ:

Հնարավորինս արագ խորհրդակցեք Ձեր բժշկի հետ՝ բնարկելու հետագա բուժման Ձեր տարրերակները և այն ամենը, ինչ Դուք պետք է իմանար: Ձեր բժիշկը կրացատրի, թե արդյոք Դուք պետք է անցնեք այլ բուժման և ինչ պետք է անեք դրա համար:

Վալպրոաթթու օգտագործած մայրերից ծնված երեխաները ավելի մեծ վտանգի տակ են.

- զարգացման բնածին արատներ և
- մտավոր և ֆիզիկական զարգացման խնդիրներ:

Երկուսն էլ կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ Ձեր երեխայի կյանքի վրա:

Ձեր բժիշկը ուշադիր հետևելու է Ձեր վիճակին՝

- Համոզվեք, որ Ձեր առողջությունը վերահսկվում է:
- Հետևեք Ձեր երեխայի զարգացմանը:

Ձեր այցելության ժամանակ Դուք և Ձեր բժիշկը կկարդաք, կլրացնեք և կստորագրեք ոհսկի մասին տեղեկացված համաձայնության ձևը: Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի Դուք իմանաք, հասկանաք և գիտակցեք հղիության ընթացքում վալպրոաթթվի դեղեր ընդունելու հետ կապված հնարավոր ոհսկերի մասին բոլոր տեղեկությունները:

1. ԵՍ ՄԻՆՉԵՎ 18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՄ. Ի՞ՆՉ Է ԻՆՉ ՀԱՄԱՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՎԱԼՊՐՈԱԹԹՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ:



Ձեզ նշանակել են վալպրոաթթու պարունակող դեղը էպիլեպսիայի բուժման համար, սա կարևոր դեղ է, որի շնորհիվ Ձեզ լավ եք զգում:



Երեխաները, որոնց մայրերը հղիության ընթացքում օգտագործել են վալպրոաթթու, կարող են առողջական լուրջ խնդիրներ ունենալ.

**Հնարավոր է պլանավորեք հղիություն:
Հետեւաբար, դուք պետք է խստորեն հետևեքայս առաջարկություններին!**

Դեռահասներ

Օրիորդներ

Ես դեռ չեմ ունեցել իմ
առաջին դաշտանը

Ես արդեն ունեցել եմ իմ
առաջին դաշտանը

Ես հղի եմ կամ
կասկածում եմ, որ հղի
եմ



Երբ դուք ունեցել եք
Ձեր առաջին դաշտանը,
հայտնեք այդ մասին



Ձեր բուժող բժիշկը
Համոզվել է, որ Դուք
Հղի չեք





Զեր բժիշկը կնշանակի
հակաբեղմնավորիչ
դեղեր, որոնք կոչվում են
հակաբեղմնավորիչներ,
նույնիսկ եթե դուք
սեռական ակտիվ կյանք
չեք վարում:
Վալպրոաթթու
ընդունելիս պետք է միշտ
օգտագործել
հակաբեղմնավորիչ
միջոցներ:



Ամեն դեպքում, պետք է տարեկան առնվազն մեկ անգամ այցելել
բժշկի:

Այցի ընթացքում Զեր բժիշկը.

- կստուգի, թե արդյոք վալպրոաթթուն դեռ ճիշտ ընտրված դեղ է Զեզ
համար,

- կպատմի վալպրոաթթվի կիրառման մասին, և

-կիսնդրի Զեզ (կամ Զեր ծնողներին/խնամակալներին) ստորագրել
փաստաթուղթ, որը կհաստատի, որ Դուք հասկանում եք բոլոր
առաջարկությունները:

Հարցերի դեպքում դիմեք Զեր բժշկին կամ ծնողին/խնամակալին:

**Երբեք մի դադարեցրեք վալպրոաթթվի ընդունումն առանց բժշկի հետ
խորհրդակցելու:**