

Фламмегис
Инфликсимаб

Карточка-памятка для пациента

Покажите эту карточку любому доктору вовлеченного в ваше лечение.

Информационная карточка для пациента содержит важную информацию о безопасности, с которой пациент должен быть ознакомлен до и во время лечения препаратом Фламмегис.

ФИО Пациента:

ФИО Врача:

Телефон Врача:

При начале приема нового препарата, пожалуйста, сохраните этот листок в качестве справочного материала в течение 4 месяцев после последней дозы препарата Фламмегис.

Пожалуйста, внимательно прочтите «Инструкцию по применению» Фламмегис перед началом приема этого лекарства.

Дата начала терапии препаратом Фламмегис:

Текущие применения:

Важно, чтобы вы и ваш врач записали торговое название и номер партии вашего лекарства.

Торговое название:

Номер партии:

Попросите вашего врача записать тип и дату последнего обследования на туберкулез (ТБ) ниже:

Тест:

Тест:

Дата:

Дата:

Результат:

Результат:

Пожалуйста, убедитесь, что у вас также есть список всех других лекарств, которые вы принимаете, при каждом посещении медицинского работника.

Список аллергий:

Список других лекарств:

Инфекции

Перед лечением препаратом Фламмегис:

- Сообщите своему врачу, если у вас есть инфекция, даже если она очень незначительная.
- Очень важно сообщить врачу, если вы когда-либо болели туберкулезом (ТБ) или если вы находились в тесном контакте с человеком, болевшим туберкулезом. Ваш врач проведет обследование, чтобы проверить, есть ли у вас туберкулез. Попросите врача записать в карту тип и дату вашего последнего обследования на туберкулез.
- Сообщите своему врачу, если у вас гепатит В или если вы знаете или подозреваете, что являетесь носителем вируса гепатита В.

Во время лечения препаратом Фламмегис сообщите своему врачу:

- Сообщите своему врачу немедленно, если у вас появятся признаки инфекции. Признаки включают лихорадку, чувство усталости, (постоянный) кашель, одышка, потеря веса, ночная потливость, диарея, раны, проблемы с зубами, жжение при мочеиспускании или «гриппоподобные» симптомы.

Беременность, Лактация и Вакцинация

- Если вы получали препарат Фламмегис во время беременности или кормите грудью, важно сообщить об этом врачу вашего ребенка до того, как ваш ребенок получит какую-либо вакцину. Вашему ребенку не следует вводить «живые вакцины», такие как БЦЖ (используемая для профилактики туберкулеза), в течение 12 месяцев после рождения или во время вашего грудного вскармливания, если врач вашего ребенка не порекомендует иное.

Храните эту карточку при себе в течение 4 месяцев после последней дозы Фламмегис или, в случае беременности, в течение 12 месяцев после рождения ребенка. Побочные эффекты могут проявиться спустя длительное время после последней дозы.