



ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դիեմոգեստի և էթինիլէստրադիոլի համակցություն պարունակող հորմոնային համակցված հակաբեղմնավորիչ դեղերի (Ժանին) վերաբերյալ

Ձեր ուշադրությունը հրավիրում ենք այն փաստի վրա, որ դիեմոգեստի և էթինիլէստրադիոլի (ԴՆԳ/ԷԷ) համակցություն պարունակող հորմոնային համակցված հակաբեղմնավորիչները ընդունող կանանց շրջանում երակային թրոմբոէմբոլիայի զարգացման ռիսկը փոքր-ինչ ավելի բարձր է՝ այն կանանց համեմատ, ովքեր ընդունում են լւոնորգեստրելի և էթինիլէստրադիոլի (ԼՆԳ/ԷԷ) համակցություն պարունակող՝ երակային թրոմբոէմբոլիայի զարգացման ցածր ռիսկով բնորոշվող հորմոնային համակցված հակաբեղմնավորիչներ:

Առողջապահության ոլորտի հարգելի մասնագետներ,

«Բայեր» ընկերությունը Ձեզ է ներկայացնում Ժանին դեղն ընդունող կանանց շրջանում երակային թրոմբոէմբոլիայի զարգացման ռիսկին վերաբերող թարմացված տվյալները:

Ամփոփագիր

- Չորս դիտարկումային փորձարկումների մետա-անալիզի արդյունքում պարզվել է, որ ԴՆԳ/ԷԷ համակցություն պարունակող հորմոնային համակցված հակաբեղմնավորիչների ընդունման դեպքում երակային թրոմբոէմբոլիայի զարգացման ռիսկը փոքր-ինչ բարձր է՝ ԼՆԳ/ԷԷ համակցությամբ հորմոնային համակցված հակաբեղմնավորիչների ընդունման համեմատ:
- Հիմնվելով նշված տվյալների վրա՝ ԴՆԳ/ԷԷ պարունակող հակաբեղմնավորիչների ընդունմամբ պայմանավորված երակային թրոմբոէմբոլիայի զարգացման ռիսկը 10 000 կանանց համար տարեկան կազմում է 8-11 դեպք:
- Տվյալները համեմատվել են հիվանդության զարգացման տարեկան հաճախականության հետ, որը լւոնորգեստրել, նորէթիստերոն կամ նորգեստիմատ պարունակող հորմոնային հակաբեղմնավորիչներ

