

Հուշաթերթիկ բուժառուի համար

<p>Ես ընդունում եմ Ռիքուլատրոն (ռիվարոքսաբան) դեղը բուժման շրջանակում</p> <p>Ռիքուլատրոն 2,5մգ <input type="checkbox"/></p> <p>Ռիքուլատրոն 10մգ <input type="checkbox"/></p> <p>Ռիքուլատրոն 15մգ <input type="checkbox"/></p> <p>Ռիքուլատրոն 20մգ <input type="checkbox"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Հուշաթերթիկը միշտ պահեք ձեր մոտ:</p> <p>Ցույց տվեք այս հուշաթերթիկը բժշկին, նույնիսկ ատամնաբույժին, յուրաքանչյուր անգամ, երբ դիմում եք բժշկական օգնության:</p> </div> <p>Ծննդյան տարեթիվ. _____</p> <p>Քաշ. _____</p> <p>Այլ դեղերի ընդունում (թվարկել).</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Ուղեկցող հիվանդություններ.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Ճտապ օգնություն պահանջող իրավիճակների առաջացման դեպքում կոնտակտային անձ (լրիվ անուն, ով է հանդիսանում բուժառուի համար)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Հեռախոսահամար.</p> <p>_____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Տեղեկատվություն առողջապահության ոլորտի մասնագետների համար</p> <p>Հարկ չկա հաշվի առնել Միջազգային նորմալացված գործակցի (ՄՆԳ) ցուցանիշները, քանի որ նրանք չեն արտացոլում Ռիքուլատրոն դեղի ակտիվության աստիճանը:</p> </div>	<p style="text-align: center;">Ի՞նչ պետք է իմանալ Ռիքուլատրոն դեղի մասին</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ռիքուլատրոն դեղը նոսրացնում է արյունը՝ կանխելով վտանգավոր թրոմբոզների առաջացումը: ➤ Ռիքուլատրոնը պետք է ընդունել ճիշտ այնպես, ինչպես նշանակել է Ձեր բժիշկը: Չի կարելի բաց թողնել դեղի ընդունումը՝ թրոմբոզից օպտիմալ պաշտպանություն ապահովելու նպատակով: ➤ Չպետք է դադարեցնել Ռիքուլատրոնի ընդունումը՝ առանց բժշկի հետ նախապես խորհրդակցելու, քանի որ արյան մակարդման վտանգը կարող է մեծանալ: ➤ Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին բոլոր այն դեղերի մասին, որոնք ընդունում եք ներկայում, ընդունել եք նախքան Ռիքուլատրոն դեղի օգտագործումը կամ պլանավորում եք ընդունել: ➤ Պարտադիր տեղեկացրեք բուժող բժշկին Ռիքուլատրոն դեղի օգտագործելու մասին՝ նախքան ցանկացած վիրահատական գործողություններ կամ ինվազիվ միջամտություն սկսելը: <p style="text-align: center;">Ե՞րբ է անհրաժեշտ դիմել բժշկի</p> <p>Արյուն նոսրացնող դեղի կիրառման դեպքում, այդ թվում Ռիքուլատրոնի, կարևոր է ուշադրություն դարձնել հնարավոր անցանկալի ռեակցիաներին:</p> <p>Արյունահոսությունը առավել հաճախ հանդիպող անցանկալի ռեակցիան է: Ինքնուրույն մի սկսեք Ռիքուլատրոն դեղի ընդունումն՝ առանց բուժող բժշկի հետ խորհրդակցելու, եթե ձեր մոտ բարձր է արյունահոսություն առաջանալու ռիսկը: Անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել բժշկի՝ արյունահոսության ցանկացած այնտանիշի առկայության դեպքում, օրինակ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Անսովոր կապտուկների առաջացում, քթային արյունահոսություն, արյունահոսություն լիզերից, կտրվածքներից երկարատև արյունահոսություն, ➤ սովորականից ավել առատ դաշտան, կամ հեշտոցային արյունահոսություն, ➤ արյուն մեզի մեջ՝ ընդ որում մեզը կարող է լինել վարդագույն կամ շագանակագույն գունավորմամբ, ➤ արյան հետքերով խորխոտ հագ, փսխում արյան կամ սրճագույն փսխման զանգվածով, ➤ ցավ, ➤ այտուց կամ անհանգստության զգացողություն մկաններում և հոդերում, ➤ գլխացավ, գլխապտույտ կամ թուլություն: <p style="text-align: center;">Ինչպե՞ս ընդունել Ռիքուլատրոն դեղը</p> <p>Օպտիմալ պաշտպանության համար Ռիքուլատրոն դեղն ընդունել՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2,5 մգ սննդի ընդունումից անկախ, ➤ 10 մգ սննդի ընդունումից անկախ, ➤ 15 մգ սնունդն ընդունելու ժամանակ, ➤ 20 մգ սնունդն ընդունելու ժամանակ:
--	---