

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Այս գրքույկի տեղեկատվությունը նախատեսված է վերարտադրողական տարիքի այն կանանց համար, որոնց նշանակում են վաղարտատներ: Ծանոթացեք այս գրքույկի, ինչպես նաև դեղորայքի բժշկական կիրառման հրահանգների հետ՝ տեղադրված դեղորայքի տուփի մեջ և դիմեք ձեր բժշկին՝ ցանկացած հարց առաջանալու դեպքում:

Սույն տեղեկատվական գրքույկի մեջ շատ տեղեկատվություն կա, խորհուրդ է տրվում այս գրքույկը ցույց տալ ընկերներին և Ձեր ընտանիքի անդամներին՝ Ձեր բուժումը քննարկելու և հասկանալու համար:

Մի նետեք այս տեղեկատվական գրքույկը: Միգուցե հարկ լինի դրա հետ կրկնակի անգամ ծանոթանալ:

ՌԻՍԿԵՐՆ ԱՊԱԳԱ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Եթե կինը վաղարտատներ է ընդունում հղիության ընթացքում, ապա դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ նրա ապագա երեխաների վրա:

Հղիության ընթացքում ինչպես առանձին վաղարտատների կիրառումը, այնպես է վերջինիս կիրառումն էպիլեպսիան բուժող այլ դեղորայքի հետ համադրությամբ, առավել վտանգավոր է՝ քան այլ հակացնցումային դեղամիջոցների կիրառումը: Որքան բարձր է դեղաչափը, այնքան ավելի բարձր է ռիսկը, բայց այնուամենայնիվ ռիսկն առկա է ցանկացած դեղաչափի դեպքում:

Վաղարտատները կարող են լուրջ բնածին արատների պատճառ դառնալ և ազդել երեխայի զարգացման վրա: Բնածին արատները ներառում են ողնաշարի զարգացման արատները (Spina Bifida), դեմքի և գանգի այլանդակությունը, սրտի, երիկամների, միզուղիների և սեռական օրգանների արատները, վերջույթների թերությունները:

Եթե դուք վաղարտատներ եք ընդունում հղիության ընթացքում, դուք ավելի մեծ ռիսկի եք ենթարկվում ծննդաբերել բնածին արատներով երեխա, քան մյուս կանայք, ովքեր պահանջում են բժշկական միջամտություն: Քանի որ վաղարտատները կիրառվում են տարիներ շարունակ, ապա մենք պարզել ենք, որ վաղարտատներ ընդունած կանանց շրջանում բնածին արատներ դիտարկվում են 100-ից 10 երեխայի մոտ: Համեմատության համար նշենք, որ էպիլեպսիայով չսառապող կանանց շրջանում բնածին արատներ նկատվում են ծնված 100 երեխայից 2-3-ի մոտ:

Ընդունված է, որ նախադպրոցական տարիքի մինչև 30-40% երեխաների մոտ, որոնց մայրերը հղիության ընթացքում վաղարտատներ են ընդունել, կարող են զարգացման խախտումներ նկատվել վաղ մանկությունում: Ներարգանդային փուլում վաղարտատների ազդեցությանը ենթարկված երեխաներն ավելի ուշ են սկսում քայլել և խոսել, մտավոր զարգացվածությունն ավելի ցածր է, քան մյուս երեխաների մոտ, և կարող են ունենալ խոսքի ու հիշողության խախտումներ:

Առտիկ սպեկտրի խախտումներն ու մանկական աուտիզմը առավել հաճախ ախտորոշվում են այն երեխաների մոտ, ովքեր վաղարտատների ազդեցությանն են ենթարկվել ներարգանդային փուլում, իսկ որոշ տվյալներ վկայում են, որ այդ երեխաների մոտ ավելի բարձր է ուշադրության պակասի կամ գերակտիվության համախտանիշի զարգացման ռիսկը (ՌԻՊԳԱՀ):

Ձեր բժշկի հետ քննարկեք ֆոլաթթվի կիրառման հնարավորությունը հղիության ընթացքում: Ֆոլաթթուն նվազեցնում է Spina Bifida-ի զարգացման և վաղ վիժման հավանականությունը, որոնց զարգացման ռիսկն առկա է ցանկացած հղիության դեպքում: Բայցևայնպես, քիչ հավանական է, որ ֆոլաթթվի կիրառումը թույլ կտա բացառել վաղարտատների կիրառմամբ պայմանավորված բնածին արատների ռիսկը:

Եթե դուք վերարտադրողական տարիքի կին եք, ապա Ձեր բժշկը Ձեզ վալպրոատներ պետք է նշանակի միայն այն դեպքում, երբ այլ բուժում Ձեզ չի օգնում:

Այս դեղը նշանակելուց բժշկը Ձեզ պետք է բացատրի, թե ինչ կարող է պատահել Ձեր երեխայի հետ, եթե Դուք կեղիանաք վալպրոատներ ընդունելու ժամանակ: Ավելի ուշ, եթե Դուք ցանկություն կունենաք երեխա ունենալ, Դուք չպետք է ընդհատեք դեղի ընդունումը մինչև բժշկի հետ հանդիպումը և Ձեր բուժման պլանի փոփոխումը, եթե իհարկե դա հնարավոր է:

ԱՌԱՋԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ

Եթե վալպրոատներ Ձեզ առաջին անգամ են նշանակվում, ապա Ձեր բժշկը կբացատրի ապագա երեխայի համար ռիսկերը՝ հղիանալու դեպքում: Եթե Դուք վերարտադրողական տարիքում եք, ապա պետք է ամբողջ բուժման ընթացքում օգտագործեք արդյունավետ հակաբեղմնավորիչներ: Դիմեք Ձեր բժշկին կամ այցելեք ընտանիքի պլանավորման գրասենյակ, եթե հակաբեղմնավորիչ միջոցի վերաբերյալ խորհրդատվության կարիք ունեք:

Հիմնական կետերը.

- **Համոզվեք, որ դուք օգտագործում եք արդյունավետ հակաբեղմնավորիչ միջոց:**
- **Անմիջապես հայտնեք Ձեր բժշկին հղիության առկայության կամ կասկածի մասին:**

ԲՈՒԺՄԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԱՆՑ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ

Եթե Դուք ստանում եք բուժում վալպրոատներով և չեք պլանավորում երեխա ունենալ, ապա համոզվեք, որ Դուք օգտագործում եք արդյունավետ հակաբեղմնավորիչ մեթոդ: Դիմեք Ձեր բժշկին կամ այցելեք ընտանիքի պլանավորման գրասենյակ, եթե հակաբեղմնավորիչ միջոցի վերաբերյալ խորհրդատվության կարիք ունեք:

Հիմնական կետերը.

- **Համոզվեք, որ դուք օգտագործում եք արդյունավետ հակաբեղմնավորիչ միջոց:**
- **Անմիջապես հայտնեք ձեր բժշկին հղիության առկայության կամ կասկածի մասին:**

ԲՈՒԺՄԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Եթե Դուք ստանում եք բուժում վալպրոատներով և պլանավորում եք երեխա ունենալ, ապա Դուք պետք է շարունակեք ընդունել վալպրոատներ և օգտագործեք արդյունավետ հակաբեղմնավորիչ մեթոդ՝ մինչև Ձեր բժշկի հետ հանդիպումը: Դուք պետք է դիմեք Ձեր բժշկին մինչև հղիանալը, քանի որ Դուք կարող եք համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել հղիության առավել արդյունավետ ընթացքի, ինչպես նաև Ձեր և Ձեր երեխայի համար առկա ռիսկերի մաքսիմալ նվազեցման համար:

Ձեր բժշկը կարող է փոխել վալպրոատների դեղաչափը կամ նշանակել այլ դեղ՝ մինչև հղիանալը: Հղիանալու դեպքում Ձեզ պետք է հատուկ ուշադրություն հատկացվի՝ ինչպես Ձեր հիվանդության վերահսկման, այնպես էլ Ձեր ապագա երեխայի զարգացման համար:

Ձեր բժշկի հետ քննարկեք ֆոլաթթվի կիրառման հնարավորությունը հղիության ընթացքում: Փոլաթթուն նվազեցնում է Spina Bifida-ի զարգացման և վաղ վիժման հավանականությունը, որոնց զարգացման ռիսկն առկա է ցանկացած հղիության դեպքում: Բայցևայնպես, քիչ հավանական է, որ ֆոլաթթվի կիրառումը թույլ կտա բացառել վալպրոատների կիրառմամբ պայմանավորված բնածին արատների ռիսկը:

Հիմնական կետերը.

- **Մի դադարեք ընդունել ձեր հակաբեղմնավորիչ մեթոդը՝ մինչև ձեր բժշկի հետ հանդիպումն ու բուժման պլանի փոփոխումը, որը կապահովի Ձեր էպիլեպսիայի/**

երկբևեռ խանգարման անհրաժեշտ վերահսկողությունն ու մինիմալ ռիսկը Ձեր երեխայի համար:

- Անմիջապես հայտնեք Ձեր բժշկին Ձեր հղիության առկայության կամ կասկածի վերաբերյալ:

ՉՊԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Հղիության ընթացքում վաղաբուժական ընդունած մայրերի երեխաները գտնվում են զարգացման բնածին արատների և վաղ զարգացման խախտումների բարձր ռիսկի վտանգի ներքո՝ այդ թվում և ծանր: Եթե դուք ընդունում եք վաղաբուժական և կարծում եք, որ հղի եք կամ կասկածում եք, որ հղի եք, ապա անմիջապես դիմեք ձեր բժշկին: Մի ընդհատեք Էպիլեպսիայի/ երկբևեռ խանգարման Ձեր դեղի ընդունումն առանց բժշկի խորհրդի:

Ձեր բժշկի հետ քննարկեք ֆոլաթթվի կիրառման հնարավորությունը հղիության ընթացքում: Ֆոլաթթուն նվազեցնում է Spina Bifida-ի զարգացման և վաղ վիժման հավանականությունը, որոնց զարգացման ռիսկն առկա է ցանկացած հղիության դեպքում: Բայցևայնպես, քիչ հավանական է, որ ֆոլաթթվի կիրառումը թույլ կտա բացառել վաղաբուժական կիրառմամբ պայմանավորված բնածին արատների ռիսկը:

Հիմնական կետերը.

- Անմիջապես հայտնեք ձեր բժշկին հղիության առկայության կամ կասկածի մասին:
- Մի դադարեք ընդունել վաղաբուժական՝ առանց բժշկի խորհրդի: